

SaronnoNews

Parco delle Groane, catturati quasi 200 Gamberi della Louisiana

· Saturday, December 19th, 2015

Nel corso del 2015 è stato realizzato un primo censimento **della distribuzione e consistenza della specie esotica invasiva Procambarus clarkii (il gambero della Louisiana)** all'interno del Parco delle Groane. L'intervento si inserisce nel progetto di cui è partner l'associazione Eliante e cofinanziato da **Fondazione Cariplo** che ha come obiettivo la conservazione delle zone umide del Parco delle Groane dato il loro elevato valore naturalistico e conservazionistico.

Perché concentrarsi sul gambero della Louisiana? Perché ha un forte impatto negativo sugli Anfibi, nutrendosi delle loro uova e larve. Inoltre la sua presenza determina un impoverimento generale dell'ambiente in termini di biodiversità. **Si riproduce dopo 6 mesi e può arrivare a fare fino a 600 uova.**

I primi risultati di questo intervento sono stati divulgati venerdì 18 dicembre **durante un incontro presso la sede del Parco delle Groane** a cui hanno partecipato Mauro Belardi di Cooperativa Eliante e Fabrizio Merati, idrobiologo che ha seguito passo dopo passo la realizzazione del censimento di *Procambarus clarkii* che si è potuto svolgere grazie alla collaborazione dei volontari del WWF Groane opportunamente formati.

Il metodo di campionamento ha previsto l'utilizzo di nasse autoportanti **a doppio inganno dalla lunghezza complessiva di 60 cm. e dal diametro di 30 cm.**

Per ogni stazione individuata sono state assegnate un numero determinato di nasse. I monitoraggi hanno previsto tornate di quattro giornate di campionamento per ogni stazione.

I RISULTATI

Stazione 1 Oasi Lipu = presenza discreta

Stazione 2 Oasi Lipu = assenza

Stazione 3 Cava Carotta = presenza molto abbondante

Stazione 4 Polveriera = assenza

Stazione 5 Laghetto Mirabello = Non campionato per assenza di acqua

Stazione 6 IV scaricatore Villorosi = presenza discreta

Stazione 7 Torrente Nirone = presenza occasionale

Stazione 8 Torrente Nirone = presenza occasionale

Stazione 9 Cavo Litta = presenza abbondante

CONCLUSIONI

Complessivamente sono stati **catturati 194 esemplari con presenze consistenti nella cava Carotta e nel Cavo Litta**. Non sono state catturate altre specie (autoctone o esotiche) di gambero. **I prossimi passaggi del progetto?** Monitoraggio di 4 nuovi ambienti di campionamento. Controllo ed eradicazione della specie tramite un sistema di trappolaggio intensivo e introduzione di specie ittiche native in grado di operare predazione del gambero della Louisiana. **Programma di reintroduzione del gambero autoctono (studio di fattibilità).**

This entry was posted on Saturday, December 19th, 2015 at 3:19 pm and is filed under
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.